

Covid-19 RECOMENDAÇÕES PARA ISOLAMENTO OU QUARENTENA



PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS SEM CONTRAINDICAÇÃO DE USO DE MÁSCARAS

DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Com sintomas leves ou moderados											
Estratégia baseada em sintomas	Início dos sintomas										
Estratégia baseada em testagem	Início dos sintomas										
Assintomáticos com COVID-19 laboratorialmente confirmada											
Estratégia baseada em sintomas*											
Estratégia baseada em testagem*											
Assintomáticos contactantes próximos domiciliares ou não											
Estratégia baseada em sintomas*											
Estratégia baseada em testagem*											
DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*Implicam o retorno com a adoção de uso rigoroso de máscaras até o 10º dia do início dos sintomas ou, se assintomático, da testagem com resultado positivo.

Fonte: NOTA TÉCNICA CONJUNTA Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro (Soperj) e Sociedade de Pediatria do Estado de São Paulo (SPSP)



Primeiro contato com pessoa com quadro sugestivo ou confirmação de covid-19



Coleta material para PCR ou teste rápido de antígeno



Resultado Positivo



Resultado Negativo



24 horas sem febre e sem uso de antitérmico



Ainda com febre ou em uso de antitérmico



Cumprir isolamento previsto para sintomático



Se assintomático e sem testagem positiva durante todo o período



Uso rigoroso de máscara facial



Isolamento



Quarentena



Retorno às atividades presenciais



PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CONTRAINDICAÇÃO DE USO DE MÁSCARAS

DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Com sintomas leves ou moderados												
Estratégia baseada em sintomas	Início dos sintomas											
Estratégia baseada em testagem	Início dos sintomas											
Assintomáticos com COVID-19 laboratorialmente confirmada												
Estratégia baseada em sintomas												
Estratégia baseada em testagem												
Assintomáticos contactantes próximos domiciliares ou não												
Estratégia baseada em sintomas												
Estratégia baseada em testagem												
DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Fonte: Adaptado de NOTA TÉCNICA CONJUNTA Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro (Soperj) e Sociedade de Pediatria do Estado de São Paulo (SPSP)

Primeiro contato com pessoa com quadro sugestivo ou confirmação de covid-19

Coleta material para PCR ou teste rápido de antígeno

Resultado Positivo

Resultado Negativo

24 horas sem febre e sem uso de antitérmico

Ainda com febre ou em uso de antitérmico

Cumprir isolamento previsto para sintomático

Se assintomático e sem testagem positiva durante todo o período

Isolamento

Quarentena

Retorno às atividades presenciais